

## PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA

FECHA DE EXAMEN: \_\_\_\_\_

HORA: \_\_\_\_\_

REPORTAR EN: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

No coma ni beba después de la medianoche para asegurarse de que el estómago esté vacío para el procedimiento. Puede tomar medicamentos aprobados con pequeños sorbos de líquidos claros hasta 3 horas antes del procedimiento.

Su conductor adulto debe quedarse con usted y llevarlo a casa. El tiempo total será de aproximadamente 3 horas.

Su médico hablará con usted sobre cualquier ajuste de los medicamentos que pueda estar tomando.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a nuestra oficina.

Si usted toma *Coumadin (Warfarin)*, *Plavix*, *Lovenox*, *Aggrenox* u otros "anticoagulantes", por favor avise a su médico o enfermera en el momento de la programación.

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology  
Kenilworth  
1225 Harding Place, Suite 5100  
Charlotte, North Carolina 28204  
704-355-8850

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology MMP  
1025 Morehead Medical Drive, Suite 300  
Charlotte, North Carolina 28204  
704-355-4593

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology  
Pineville  
10650 Park Road, Suite 480  
Charlotte, North Carolina 28210  
704-667-0520

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology  
Huntersville  
16455 Statesville Road, Suite 200  
Huntersville, NC 28078  
704-801-3011

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology  
Union West  
1100 Healing Way, Suite Suite 21  
Matthews, NC 28104  
980-993-1770

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology  
University  
101 East WT Harris Blvd. Suite 3301  
Charlotte, NC 28262  
704-863-1400

# Instrucciones para la Endoscopia Superior Ambulatoria

Carolinas Gastroenterology Centros  
www.carolinashhealthcare.org/carolinas-gastroenterology-centers  
Ballantyne • 15110 John J. Delaney Dr., Suite 120  
Charlotte, NC 28277  
704-512-2140

Atrium Health Endoscopy Center Kenilworth  
1225 Harding Place Suite 5200  
Charlotte, NC 28204  
704-355-4178

Atrium Health Main • 1000 Blythe Blvd. 4th Floor  
Unidad de Endoscopia  
Charlotte, NC 28203

Atrium Health Pineville - Pineville • 10628 Park Road 1st Floor  
Unidad de Endoscopia  
Charlotte, NC 28210

Atrium Health Mercy - Mercy • 2001 Vail Avenue  
Charlotte, NC 28207


Pineville Endoscopy Center • 10520 Park Rd., Suite 105  
Charlotte, NC 28210  
704-927-5756

Huntersville Endoscopy Center • 16455 Statesville Rd., Suite 114  
Huntersville, NC 28078  
704-237-9290

Atrium Health Union West • 1000 Healing Way, Endoscopy Suite  
Matthews, NC 28104

Gastroenterología  
Corlan Eboh, MD  
Nicholas Anthony, MD  
Shailendra S. Chauhan, MD  
Andrew M. Dries, MD  
Jason J. Lewis, MD  
Nilesh Lodhia, MD  
Thomas Pacicco, MD  
David S. Sachar, MD  
Richard L. Sigmon Jr., MD  
David C. Olson, MD  
Lee B. Sigmon, MD  
Lauren I. Browne, MD  
Baha Moshiree, MD  
Brittany Seminara, MD  
Linsey E. Spence, DO  
Joseph H. Zeidan, MD  
Jennifer Wellington, DO  
Paris Charilaou, MD  
Milin Patel, MD  
Natasha Adlakha, MD  
Maithili Chitnavis, MD

# ENDOSCOPIA SUPERIOR



## LA PRUEBA

La endoscopia superior (*también llamada esofagogastroduodenoscopia o EGD*) es un procedimiento en el que se traga un tubo flexible para que el médico pueda examinar el esófago (*tubo de la deglución*), el estómago y el duodeno (*primera parte del intestino delgado*).

## RAZONES PARA LA PRUEBA

Se puede realizar una endoscopia superior para evaluar los siguientes problemas:

- Náuseas y vómitos
- Dolor abdominal superior
- Inserción del tubo de alimentación

- Dificultad para tragar o dolor al tragar
- Sangrado del esófago, el estómago o el duodeno
- Rayos X anormales del tracto digestivo superior (*por ejemplo, una úlcera de estómago o un tumor*)
- Anemia por deficiencia de hierro

Además, se pueden pasar diferentes instrumentos a través del endoscopio con el fin de realizar una biopsia o de tratar ciertas condiciones del tracto intestinal superior. Las condiciones que pueden tratarse incluyen úlceras sangrantes y/o pólipos (*crecimientos anormales*). Los objetos atrapados en el esófago también pueden ser extraídos con el endoscopio.

## ¿QUÉ SUCEDE DURANTE LA ENDOSCOPIA?

Se iniciará un intravenoso antes del procedimiento y se conectarán monitores para que la presión sanguínea y la respiración puedan ser monitoreadas durante el examen. Usted estará acostado sobre su lado izquierdo durante el procedimiento. La enfermera le rociará la garganta para minimizar el reflejo nauseoso. Luego se le administrarán medicamentos por vía intravenosa para sedarlo. Luego se le pedirá que se trague el endoscopio. Esto no causa dolor y no interfiere con su respiración. El procedimiento tarda de 15 a 30 minutos en realizarse.

## POSTERIORMENTE

Se le vigilará en un área de recuperación hasta que la mayoría de los efectos de los medicamentos hayan desaparecido. Esto suele durar unos 30 a 60 minutos. Es posible que le duela ligeramente la garganta después del examen y que se sienta hinchado inmediatamente después del procedimiento debido al aire que se colocó en el estómago durante el examen. Podrá reanudar su dieta habitual después del examen a menos que su médico le indique lo contrario.

## POSIBLES

## COMPLICACIONES DE LA ENDOSCOPIA SUPERIOR

La endoscopia superior es un procedimiento seguro. Aunque pueden ocurrir complicaciones, son raras cuando el procedimiento es realizado por un médico que ha sido especialmente entrenado en el procedimiento. Las principales complicaciones incluyen hemorragia, (3 por 10,000), cuando se realiza una biopsia o se extrae un pólipo; y perforación, (3 por 10,000), que es un desgarro en el revestimiento del tracto gastrointestinal que podría requerir cirugía para su reparación. Otros posibles riesgos son las reacciones a los sedantes utilizados. Una complicación menor que puede ocurrir es la irritación de la vena en el sitio de la intravenosa. Esto no es peligroso y desaparece en unas pocas semanas.