

## PRÉPARATION POUR LE TEST

DATE DE L'EXAMEN : \_\_\_\_\_

HEURE : \_\_\_\_\_

HEURE D'ARRIVÉE : \_\_\_\_\_

Ne rien manger ou boire après minuit pour assurer que l'estomac soit vide pour la procédure. On peut prendre les médicaments approuvés avec de petites gorgées de liquide clair jusqu'à 3 heures avant la procédure.

Un chauffeur adulte doit rester avec vous et vous ramener chez vous. La période totale sera de 3 heures environ.

Le médecin mentionnera tout ajustement à apporter aux médicaments que l'on prend.

Pour toute question, contacter nos bureaux.

Si on prend le coumaphène (warfarine), plavix, lovenox, aggrenox ou autres « anticoagulants », veuillez en avertir le médecin ou l'infirmier/infirmière au moment de la prise de rendez-vous.

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology Kenilworth  
1225 Harding Place, Suite 5100  
Charlotte, North Carolina 28204  
704-355-8850

Atrium Health  
Gastroenterology & Hepatology MMP  
1025 Morehead Medical Drive, Suite 300  
Charlotte, North Carolina 28204  
704-355-4593

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology  
Pineville  
10650 Park Rd. , Suite 480  
Charlotte, North Carolina 28210  
704-667-0520

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology  
Huntersville  
16455 Statesville Road, Suite 200  
Huntersville, NC 28078  
704-801-3011

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology  
Union West  
1100 Healing Way, Suite 21  
Matthews, NC 28104  
980-993-1770

Atrium Health Gastroenterology &  
Hepatology-University  
101 East WT Harris Blvd., Suite 3301  
Charlotte, NC 28262  
Phone 704-863-1400

# Instructions d'endoscopie haute ambulatoire

Carolinas Gastroenterology Centers  
www.carolinashealthcare.org/carolinas-  
gastroenterology-centers

Ballantyne • 15110 John J. Delaney Dr., Suite  
120 Charlotte, NC 28277  
704-512-2140

Atrium Health Endoscopy Center  
Kenilworth 1225 Harding Place • Suite  
5200  
Charlotte, NC 28204  
704-355-4178

Atrium Health Main • 1000 Blythe Blvd. 4th  
Floor Endoscopy Unit  
Charlotte, NC 28203

Atrium Health Pineville - Pineville • 10628 Park Rd.,  
1st Floor Endoscopy Unit  
Charlotte, NC 28210

Atrium Health Mercy - Mercy • 2001 Vail Avenue  
Charlotte, NC 28207

Pineville Endoscopy Center • 10520 Park Rd.,  
Suite 105 Charlotte, NC 28210  
704-927-5756

Huntersville Endoscopy Center • 16455 Statesville Rd.,  
Suite 114 Huntersville, NC 28078  
704-237-9290

Atrium Health Union West • 1000 Healing Way,  
Endoscopy Suite Matthews, NC 28104

*Gastroenterology Corlan*

*Eboh, MD Nicholas*

*Anthony, MD*

*Shailendra S. Chauhan, MD*

*Andrew M. Dries, MD Jason J.*

*Lewis, MD*

*Nilesh Lodhia, MD Thomas*

*Pacicco, MD David S.*

*Sachar, MD Richard L.*

*Sigmon Jr., MDDavid C.*

*Olson, MD*

*Lee B. Sigmon, MD*

*Lauren I. Browne, MD*

*Baha Moshiree, MD*

*Brittany Seminara, MD*

*Linsey E. Spence, DO*

*Joseph H. Zeidan, MD*

*Jennifer Wellington, DO*


*Paris Charilaou, MD*

*Milin Patel, MD Natasha*

*Adlakra, MD Maithili*

*Chitnavis, MD*

## ENDOSCOPIE HAUTE



### LE TEST

L'endoscopie haute (*appelée aussi œsogastroduodénoscopie ou ŒGD*) est une procédure dans laquelle un tube souple est avalé pour que le médecin puisse examiner l'œsophage (*qui avale le tube*), l'estomac et le duodénum (*première partie de l'intestin grêle*).

### RAISONS POUR LE TEST

L'endoscopie haute peut être effectuée pour évaluer les problèmes suivants :

- Nausée et vomissements
- Douleurs dans la région abdominale supérieure
- Insertion d'une sonde gastrique

- Difficultés pour avaler ou déglutition douloureuse
- Hémorragie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum
- Radiographies anormales de la voie digestive supérieure (*par exemple, ulcère ou tumeur de l'estomac*)
- Anémie due à une carence en fer

En outre, différents instruments peuvent être amenés dans l'endoscope à des fins de biopsie ou de traitement de certaines conditions de la voie intestinale supérieure.

Les conditions qui peuvent être traitées comprennent les ulcères et/ou les polypes hémorragiques (*tumeurs anormales*). Les objets coincés dans l'œsophage peuvent aussi être retirés avec l'endoscope.

### QUE SE PASSE-T-IL PENDANT L'ENDOSCOPIE ?

Une perfusion IV sera effectuée avant la procédure et des moniteurs seront connectés pour que la pression artérielle et la respiration puissent être surveillées pendant le test. On reste allongé sur le côté gauche pendant la procédure. On reçoit alors des sédatifs par la ligne IV. Ensuite, un tube souple et mince sera placé dans la bouche pour que le médecin puisse voir la voie digestive depuis l'intérieur. La procédure prend 15 à 30 minutes.

### PAR LA SUITE

On est surveillé dans une aire de récupération jusqu'à ce que la plupart des effets des médicaments se dissipent. Ceci dure en général 30 à 60 minutes. La gorge pourrait être légèrement endolorie après le test et on pourrait se sentir gonflé juste après la procédure à cause de l'air qui est entré dans l'estomac pendant le test. On peut reprendre une alimentation normale après le test, sauf indication contraire du médecin.

### COMPLICATIONS POSSIBLES DE L'ENDOSCOPIE HAUTE

L'endoscopie haute est une manipulation sûre. Bien que des complications puissent se produire, elles sont rares lorsque la procédure est effectuée par un médecin spécialement formé. Les complications majeures comprennent l'hémorragie (3 cas sur 10 000) lorsqu'une biopsie est effectuée ou un polype est retiré ; et la perforation (3 cas sur 10 000) ou déchirure de la paroi de la voie gastro-intestinale, dont la réparation pourrait nécessiter une intervention chirurgicale. Les autres risques potentiels comprennent les réactions aux sédatifs employés. Une complication mineure possible serait l'irritation de la veine au site de l'IV. Elle n'est pas dangereuse et disparaît après quelques semaines.