

PREPARO PARA O EXAME

DATA DO EXAME:

HORÁRIO: _____

LOCAL: _____

Não coma nem beba nada depois da meia-noite para garantir que o estômago está vazio para o procedimento. Você pode tomar os medicamentos autorizados com pequenos goles d'água até três horas antes do procedimento.

Seu acompanhante adulto precisa permanecer no local e dirigir quando estiverem voltando para casa. O tempo total será de aproximadamente três horas.

O médico conversará com você a respeito de eventuais ajustes aos medicamentos que esteja tomando.

Ligue para nosso consultório caso tenha dúvidas.

Caso esteja tomando Coumadin (varfarina), Plavix, Lovenox, Aggrenox ou outros remédios para “afinar” o sangue, avise o médico ou enfermeiro quando estiver marcando o exame.

Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology Kenilworth
1225 Harding Place, Suite 5100
Charlotte, North Carolina, 28204
(704) 355-8850

Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology MMP
1025 Morehead Medical Drive, Suite 300
Charlotte, North Carolina, 28204
(704) 355-4593

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology
Pineville
10650 Park Rd., Suite 480
Charlotte, North Carolina, 28210
(704) 667-0520

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology
Huntersville
16455 Statesville Road, Suite 200
Huntersville, NC, 28078
(704) 801-3011

Atrium Health Gastroenterology & Hepatology
Union West
1100 Healing Way, Suite 21
Matthews, NC, 28104
(980) 993-1770

Atrium Health Gastroenterology &
Hepatology-University
101 East WT Harris Blvd., Suite 3301
Charlotte, NC, 28262
Tel (704) 863-1400

Instruções para endoscopia digestiva alta ambulatorial

Centros de Gastroenterologia Carolinas
www.carolinashealthcare.org/carolinas-gastroenterology-centers

Ballantyne • 15110 John J. Delaney Dr., Suite 120
Charlotte, NC, 28277
(704) 512-2140

Atrium Health Endoscopy Center Kenilworth
1225 Harding Place • Suite 5200
Charlotte, NC, 28204
(704) 355-4178

Atrium Health Main • 1000 Blythe Blvd. 4th Floor
Endoscopy Unit
Charlotte, NC, 28203

Atrium Health Pineville - Pineville • 10628 Park Rd., 1st Floor
Endoscopy Unit
Charlotte, NC, 28210

Atrium Health Mercy - Mercy • 2001 Vail Avenue
Charlotte, NC, 28207


Pineville Endoscopy Center • 10520 Park Rd., Suite 105
Charlotte, NC, 28210
(704) 927-5756

Huntersville Endoscopy Center • 16455 Statesville Rd., Suite 114
Huntersville, NC, 28078
(704) 237-9290

Atrium Health Union West • 1000 Healing Way, Endoscopy Suite
Matthews, NC, 28104

Gastroenterologia
Dra. Corlan Eboh
Dr. Nicholas Anthony
Dr. Shailendra S. Chauhan
Dr. Andrew M. Dries
Dr. Jason J. Lewis
Dr. Nilesh Lodhia
Dr. Thomas Pacicco
Dr. David S. Sachar
Dr. Richard L. Sigmon Jr.
Dr. David C. Olson
Dr. Lee B. Sigmon
Dra. Lauren I. Browne
Dra. Baha Moshiree
Dra. Brittany Seminara
Dra. Linsey E. Spence
Dr. Joseph H. Zeidan
Dra. Jennifer Wellington
Dr. Paris Charilaou
Dr. Milin Patel
Dra. Natasha Adlakha
Dra. Maithili Chitnavis

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA



O EXAME

Uma endoscopia digestiva alta (*também denominado esofagogastroduodenoscopia ou EGD*) consiste em um procedimento pelo qual um tubo flexível é inserido na garganta para permitir que o médico examine o esôfago (*porção tubular do trato digestivo*), estômago e duodeno (*a porção inicial do intestino delgado*).

MOTIVO PARA O EXAME

É possível que uma endoscopia digestiva alta seja realizada para avaliar os seguintes problemas:

- Náusea and vômito
- Dor na parte superior do abdômen
- Inserção de sondas de alimentação

- Dificuldade ou dor para engolir
- Sangramento no esôfago, estômago ou duodeno
- Radiografias do trato digestivo superior com resultados alterados (*p.ex., uma úlcera ou tumor no estômago*)
- Anemia por deficiência de ferro

Além disso, é possível inserir vários outros instrumentos através do endoscópio para realizar a coleta de biópsia ou para tratar determinados quadros clínicos do trato intestinal superior.

Os quadros clínicos que podem ser tratados incluem úlceras hemorrágicas e/ou pólipos (*massas*). O endoscópio também pode ser usado para remover objetos presos no esôfago.

O QUE ACONTECE DURANTE A ENDOSCOPIA?

Um acesso intravenoso será puncionado antes do procedimento e serão conectados monitores para poder monitorar a pressão arterial e a respiração durante o exame. A pessoa fica deitada de lado, sobre o lado esquerdo, durante o procedimento. Depois disso, medicação é administrada pelo acesso intravenoso para colocar o paciente sob sedação. A seguir, um tubo fino e flexível é inserido através da boca para que o médico possa ver o trato digestivo por dentro. O procedimento demora aproximadamente 15 a 30 minutos para ser realizado.

APÓS O EXAME

O paciente fica sendo monitorado em uma sala de recuperação até que a maioria dos efeitos da medicação tenham passado. Isso geralmente demora entre 30 e 60 minutos. Talvez a garganta fique um pouco dolorida depois do exame e é possível que o paciente apresente distensão abdominal logo depois do procedimento devido ao ar que é administrado ao estômago durante o exame. O paciente pode voltar a consumir a dieta normal após o exame, salvo instrução em contrário pelo médico.

POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES DA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

A endoscopia digestiva alta é um procedimento seguro. Embora seja possível que ocorram complicações, elas raramente ocorrem quando o procedimento é realizado por um médico que recebeu formação especializada para realizar o procedimento. Complicações graves incluem hemorragia (3 em 10.000), caso seja feita coleta de biópsia ou remoção de um pólipos e perfuração (3 em 10.000), que é uma laceração no revestimento do trato gastrointestinal que talvez precise de reparo cirúrgico. Outros possíveis riscos incluem reação aos sedativos utilizados. Uma complicação leve que pode ocorrer é irritação da veia no local de inserção do acesso intravenoso. Isso não é perigoso e desaparece após algumas semanas.