

Брошюра по амбулаторной эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта

ПОДГОТОВКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ

ДАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ: _____

ВРЕМЯ: _____

МЕСТО: _____

Не пейте и не ешьте ничего после полуночи, чтобы желудок был пустым к моменту проведения обследования. Вы можете принимать разрешенные лекарства, запивая их малым количеством прозрачной жидкости, до тех пор, пока до проведения обследования не останется 3 часа.

Взрослый водитель должен оставаться с вами, чтобы отвезти вас домой. На всю процедуру уйдет около 3-х часов.

Врач обсудит с вами все возможные изменения в приеме лекарств.

Если у вас есть вопросы, позвоните нам в офис.

Если вы принимаете кумадин (варфарин) (Coumadin (Warfarin)), плавикс (Plavix), лавнокс (Lovenox), аггренокс (Aggrenox) или иные антикоагулянты, скажите об этом врачу или медсестре при назначении даты и времени обследования.

Отделение гастроэнтерологии и гепатологии
в Кенилворсе
Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology Kenilworth
1225 Harding Place, Suite 5100
Charlotte, North Carolina 28204
Тел. 704-355-8850

Офис гастроэнтерологии и гепатологии № 1025
Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology MMP 1025
Morehead Medical Drive, Suite 300
Charlotte, North Carolina 28204
Тел. 704-355-4593

Отделение гастроэнтерологии и гепатологии
в Пайнвилле
Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology Pineville
10650 Park Rd., Suite 480
Charlotte, North Carolina 28210
Тел. 704-667-0520

Отделение гастроэнтерологии и гепатологии
в Хантерсвилле
Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology Huntersville
16455 Statesville Road, Suite 200
Huntersville, NC 28078
Тел. 704-801-3011

Отделение гастроэнтерологии и гепатологии
в Юнион Вест
Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology Union West
1100 Healing Way, Suite 21
Matthews, NC 28104
Тел. 980-993-1770

Университетский центр гастроэнтерологии и
гепатологии
Atrium Health
Gastroenterology & Hepatology-University
101 East WT Harris Blvd., Suite 3301
Charlotte, NC 28262
Тел. 704-863-1400

Гастроэнтерологические центры в штатах Северная
и Южная Каролина
(Carolinas Gastroenterology Centers)
www.carolinashealthcare.org/carolinas-gastroenterology-centers

Ballantyne • 15110 John J. Delaney Dr., Suite
120 Charlotte, NC 28277
704-512-2140

Atrium Health Endoscopy Center
Kenilworth 1225 Harding Place • Suite
5200
Charlotte, NC 28204
704-355-4178

Atrium Health Main • 1000 Blythe Blvd. 4th
Floor Endoscopy Unit
Charlotte, NC 28203

Atrium Health Pineville - Pineville • 10628 Park Rd.,
1st Floor Endoscopy Unit
Charlotte, NC 28210

Atrium Health Mercy - Mercy • 2001 Vail Avenue
Charlotte, NC 28207


Pineville Endoscopy Center • 10520 Park Rd.,
Suite 105 Charlotte, NC 28210
704-927-5756

Huntersville Endoscopy Center • 16455 Statesville Rd.,
Suite 114 Huntersville, NC 28078
704-237-9290

Atrium Health Union West • 1000 Healing Way,
Endoscopy Suite Matthews, NC 28104

Врачи-гастроэнтерологи
врач Корлэн Эбо (Corlan Eboh),
врач Николас Антони (Nicholas Anthony),
врач Шаилендра С. Шохан (Shailendra S. Chauhan),
врач Эндрю М. Драйс (Andrew M. Dries),
врач Джейсон Дж. Люис (Jason J. Lewis),
врач Найлеш Лодхья (Nilesh Lodhia),
врач Томас Пэйсикко (Thomas Pacicco),
врач Дэвид С. Сэйчар (David S. Sachar),
врач Ричард Л. Саймон, мл. (Richard L. Sigmon Jr.),
врач Дэвид К. Олсон (David C. Olson),
врач Ли Б. Саймон (Lee B. Sigmon),
врач Лорен Л. Брауни (Lauren I. Browne),
врач Баха Мошайри (Baha Moshiree),
врач Бриттани Семинэйра (Brittany Seminar),
врач-остеопат Линси Е. Спенс (Linsey E. Spence),
врач Джозеф Х. Зейдэн (Joseph H. Zeidan),
врач-остеопат Дженнифер Веллингтон
(Jennifer Wellington),
врач Пэрис Чарилау (Paris Charilaou),
врач Милин Пэйтел (Milin Patel),
врач Наташа Эдлэйхэ (Natasha Adlakha),
врач Мэйтили Читнэвис (Maithili Chitnavis)

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта



ОБСЛЕДОВАНИЕ

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта (также называемая эзофагогастродуоденоскопией (ЭФГДС)) – это процедура, при которой пациент глотает гибкую трубку для того, чтобы врач смог осмотреть пищевод (трубку, по которой проходит проглоченная пища), а также желудок и двенадцатиперстную кишку (первый участок тонкого кишечника).

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта может проводиться для оценки следующих состояний и решения следующих задач:

- Тошнота и рвота
- Боль в верхней части живота

- Введение зонда для питания
- Трудности с глотанием или боль при глотании
- Кровотечение из пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки
- Нарушения, выявленные на рентгеновском снимке верхней части пищеварительного тракта (напр., язва или опухоль желудка)
- Железодефицитная анемия

Кроме того, через эндоскоп можно вводить различные инструменты для взятия биопсии или лечения некоторых заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в том числе, кровоточащих язв и (или) полипов (аномальных образований). С помощью эндоскопа можно также удалять предметы, попавшие в пищевод.

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ ЭНДОСКОПИИ?

До начала процедуры будут установлен катетер для внутривенных инъекций и подключены мониторы для контроля кровяного давления и дыхания в ходе обследования. Во время проведения процедуры вы будете лежать на боку. Через катетер будет введено лекарство седативного действия. Затем в рот вводится тонкая гибкая трубка для того, чтобы врач смог заглянуть в пищеварительный тракт. На проведение процедуры уйдет от 15 до 30 минут.

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Вы будете находиться под наблюдением в послепроцедурном помещении до тех пор, пока почти не пройдет действие лекарств. На это обычно уходит от 30 до 60 минут. После процедуры у вас может немного болеть горло и из-за попадания в желудок воздуха может пучить живот. Если врач не даст иных указаний, вы сможете вернуться к обычной диете после обследования.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЭНДОСКОПИИ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Эндоскопия верхних отделов желудочно-кишечного тракта является безопасной процедурой. Хотя осложнения бывают, они крайне редки, если врач, проводящий процедуру, специально подготовлен для ее проведения. В число серьезных осложнений входят кровотечение (в 3-х случаях из 10000) при взятии биопсии или удалении полипа, а также перфорация (в 3-х случаях из 10000), т.е., разрыв оболочки желудочно-кишечного тракта, что может потребовать хирургического вмешательства. Другим фактором риска является реакция на седативное лекарство. Раздражение вены в месте введения катетера может также быть незначительным осложнением. Оно неопасно и пройдет в течение нескольких недель.