



Preparo com PlenVu

CONSUMIR APENAS LÍQUIDOS TRANSPARENTES NO DIA ANTERIOR AO PROCEDIMENTO

“Dados recentes demonstraram que pacientes que tomam simeticona (Gas-X) durante o processo de preparo intestinal apresentam melhores resultados da colonoscopia e um preparo intestinal mais completo. A simeticona ajuda a combater o excesso de gases no trato gastrointestinal, o que melhora a visualização. Por gentileza, adquira simeticona na forma de comprimidos na farmácia e tome 02 (dois) comprimidos em cada uma das duas etapas do preparo intestinal. Esse medicamento é de baixo custo e não precisa de receita médica. Somos impedidos por lei a incluir esse medicamento no seu kit de preparo.”

Seu exame será no dia: _____

Você iniciará o preparo com PlenVu no dia: _____

O processo de preparo para seu exame será realizado com PlenVu. Este documento fornece instruções passo a passo sobre como realizar o preparo com PlenVu.

Você começará o preparo com PlenVu no dia anterior ao seu exame.

- Beba no mínimo quatro copos de água grandes durante o dia.
- O preparo começa às **18h**.
- No recipiente de mistura, dissolva o conteúdo do envelope da Dose 1 com 480 ml de água e agite ou misture com uma colher até estar completamente dissolvido. Isso pode demorar entre dois e três minutos.
- Tome **todo** o líquido até no máximo 30 minutos depois de ter misturado.
- Você precisa tomar **mais uma** medida de 480 ml de água fria ou gelada entre às 18h e às 20h.

O preparo com PlenVu continuará na manhã do procedimento.

- Você começará a tomar a segunda dose 05 (cinco) horas antes do exame. É possível que isso signifique que você precise acordar cedo, dependendo do horário do seu exame.
- No recipiente de mistura, dissolva a Dose 2 (Envelope A e Envelope B) com 480 ml de água e agite ou misture com uma colher até estar completamente dissolvido.
- Isso pode demorar entre dois e três minutos.
- Tome **todo** o líquido até no máximo 30 minutos depois de ter misturado.
- Você precisa tomar **mais uma** medida de 480 ml de água fria ou gelada nas próximas duas horas.

Caso tenha náuseas ou vômito, tire um intervalo de 15 a 30 minutos sem beber PlenVu ou água, e depois tente recomeçar a beber até ter tomado tudo.

Lembre-se...

- **Não beba nada nas três horas anteriores ao exame.**
- Uma vez que tenha concluído o processo de preparo, a evacuação deve ter um aspecto de líquido transparente amarelado ou esverdeado. Não deve haver nenhuma substância sólida ou grande na evacuação. Se a evacuação não estiver transparente e líquida, você precisa ligar para nosso consultório e nos avisar.



Atrium Health

Comece a consumir líquidos transparentes _____

Não consuma nenhum alimento sólido durante todo o dia anterior ao procedimento

FAVOR LER:

“Dados recentes demonstraram que pacientes que tomam simeticona (Gas-X) durante o processo de preparo intestinal apresentam melhores resultados da colonoscopia e um preparo intestinal mais completo. A simeticona ajuda a combater o excesso de gases no trato gastrointestinal, o que melhora a visualização. Por gentileza, adquira simeticona na forma de comprimidos na farmácia e tome 02 (dois) comprimidos em cada uma das duas etapas do preparo intestinal. Esse medicamento é de baixo custo e não precisa de receita médica. Somos impedidos por lei a incluir esse medicamento no seu kit de preparo.”

Preparo com Colyte/Golytely/NuLyte/Gavilyte/TriLyte

Seu exame será no dia: _____

Seu preparo começa no dia: _____

O processo de preparo para seu exame será realizado com _____. Este documento fornece instruções passo a passo sobre como realizar o preparo.

Você começará o preparo no dia anterior ao seu exame.

- Beba no mínimo quatro copos de água grandes durante o dia.
- Você pode preparar os 4 litros da mistura no começo da tarde para que ela tenha tempo de gelar até a hora que você precisa começar tomá-la.
 - Acrescente água até a linha superior da garrafa.
 - Se o Colyte tiver vindo com o sabor que você escolheu, coloque-o na garrafa.
 - Tampe a garrafa, agite e coloque na geladeira.
- O preparo começa às **18h**.
- Tome dois comprimidos de bisacodil ou Dulcolax com água.
- Às **18h** comece a tomar a mistura que preparou anteriormente.
- Beba um copo da mistura cada 15 a 20 minutos até ter tomado metade (aprox. dois litros).

Você dará continuidade ao preparo no dia do exame.

- Você começará a tomar o resto da mistura **exatamente cinco horas antes do exame**. É possível que isso signifique que você precise acordar cedo, dependendo do horário do seu exame.
- Beba todo o resto da solução. **Você precisa terminar de tomar tudo em no máximo uma hora.**

Caso tenha náuseas ou vômito, tire um intervalo de cinco a 15 minutos sem beber a solução ou água, e depois tente recomeçar a beber até ter tomado tudo.

Lembre-se...

- **Não beba nada nas três horas anteriores ao procedimento.**
- Uma vez que tenha concluído o processo de preparo, a evacuação deve ter um aspecto de líquido transparente amarelado ou esverdeado. Não deve haver nenhuma substância sólida ou grande na evacuação. Se a evacuação não estiver transparente e líquida, você precisa ligar para nosso consultório e nos avisar.