



Su Preparación PlenVu

LÍQUIDOS CLAROS SÓLO EL DÍA ANTERIOR A SU PROCEDIMIENTO

"Datos e investigaciones recientes han demostrado que los pacientes que toman simeticona (GAS-X) con su preparación de colon tienen mejores resultados en la colonoscopia y preparaciones de colon más completas. La simeticona ayudará a reducir las burbujas en el tracto gastrointestinal, lo que mejora la visualización. Le pedimos que obtenga las tabletas de simeticona en su farmacia y que tome dos (2) tabletas con cada porción de la preparación dividida. Estas son baratas y de venta libre y no requieren receta médica. Por ley, no podemos incluirlas en su kit de preparación."

Su prueba es en: _____

Comenzará su preparación de PlenVu en: _____

Usarán la preparación de PlenVu para prepararse para su prueba. Esta hoja le dará instrucciones paso a paso sobre cómo usar la preparación de PlenVu.

El día antes de su prueba comenzará la preparación de PlenVu.

- Beba al menos 4 vasos grandes de agua durante el día.
- **A las 6:00 p.m.** comenzará la preparación.
- Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la bolsa de la Dosis 1 con 16 onzas de agua agitando o usando una cuchara hasta que se disuelva completamente. Esto puede tomar de 2 a 3 minutos.
- Bébalo **todo** en los 30 minutos siguientes a la mezcla.
- Entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., necesita beber **2 más** de los contenedores de 16 onzas de agua fría o templada.

La mañana de su prueba continuará con la preparación de PlenVu.

- 5 horas antes de su prueba comenzará la segunda dosis. Esto puede significar que tiene que levantarse temprano, dependiendo de la hora de la prueba.
- Utilice el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la Dosis 2 (Bolsa A y Bolsa B) con 16 onzas de agua agitando o usando una cuchara hasta que se disuelva completamente. Esto puede tomar de 2 a 3 minutos.
- Bébalo **todo** en los 30 minutos siguientes a la mezcla.
- Durante las próximas 2 horas, necesita beber **1 más** del contenedor de 16 onzas de agua fría.

Si tienes náuseas o vómitos, tome un descanso de 15 a 30 minutos para beber el PlenVu o el agua. Luego intente beber de nuevo hasta que todo haya desaparecido.

Recuerde . . .

- **No beba nada 3 horas antes de la prueba.**
- Después de terminar la preparación, sus evacuaciones intestinales deben ser de un líquido acuoso amarillo claro o verde claro. No debe haber partes sólidas o grandes en él. Si no es claro y acuoso, debe llamar a nuestra oficina para hacernos saber.



Atrium Health

Comience con Líquidos Claros _____

No Alimentos Sólidos Todo el Día Antes de su Procedimiento

POR FAVOR LEA:

"Datos e investigaciones recientes han demostrado que los pacientes que toman simeticona (GAS-X) con su preparación de colon tienen mejores resultados en la colonoscopia y preparaciones de colon más completas. La simeticona ayudará a reducir las burbujas en el tracto gastrointestinal, lo que mejora la visualización. Le pedimos que obtenga las tabletas de simeticona en su farmacia y que tome dos (2) tabletas con cada porción de la preparación dividida. Estas son baratas y de venta libre y no requieren receta médica. Por ley, no podemos incluirlas en su kit de preparación."

Su preparación *Colyte/Golytely/NuLytely/Gavilyte/TriLyte*

Su prueba es en: _____

Comenzará su preparación en: _____

Utilizará _____ para prepararse para su prueba. Esta hoja le dará instrucciones paso a paso sobre cómo usar la preparación.

El día antes de su prueba comenzará la preparación.

- Beba al menos 4 grandes vasos de agua durante el día.
- En algún momento de la tarde, puede mezclar un galón de la solución de preparación para que esté fría para cuando necesite empezar a beberla.
 - Añada agua a la línea superior de la botella.
 - Si el *Colyte* vino con el sabor que usted eligió, póngalo en la botella.
 - Ponga la tapa o el tapón de la botella, agítela y póngala en el refrigerador.
- A las **6:00 p.m.** comenzará la preparación.
- Tome 2 tabletas de *Bisacodyl* o *Dulcolax* con agua.
- A las **6:00 p.m.** comience a beber la mezcla que hizo antes.
- Beba un vaso cada 15 o 20 minutos hasta que haya terminado medio galón.

El día de su prueba continuará con la preparación.

- **Exactamente 5 horas antes de su prueba**, comenzará a beber el resto de la mezcla. Esto puede significar que tiene que levantarse temprano, dependiendo de la hora de su prueba.
- Beba todo el resto de la solución. **No debería tardar más de una hora en beberla.**

Si tienes náuseas o vómitos toma un descanso de 5 a 15 minutos de beber la preparación. Luego intente beber de nuevo hasta que todo haya desaparecido.

Recuerde . . .

- **No beba nada 3 horas antes de su procedimiento.**
- Después de que haya terminado su preparación, sus evacuaciones intestinales (heces) deben ser de un líquido acuoso de color amarillo claro o verde claro. No debe haber partes sólidas o grandes en él. Si no es claro y acuoso, debe llamar a nuestra oficina para informarnos.