



Ваша підготовка PlenVu

ПРОЗОРИ РІДИНИ ЛИШЕ ЗА ДЕНЬ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЮ

«Останні дані та дослідження показали, що пацієнти, які приймають симетикон (GAS-X) разом із препаратом для товстої кишки, мають кращі результати колоноскопії та повнішу підготовку товстої кишки. Симетикон допоможе зменшити бульбашки в шлунково-кишковому тракті, що покращує візуалізацію. Ми просимо вас отримати таблетки симетикону в аптеці та приймати дві (2) таблетки з кожною порцією розділеного препарату. Вони недорогі, продаються без рецепта і не потребують рецепта. Відповідно до закону ми не можемо включити їх у ваш підготовчий набір».

Ваш тест (дата): _____

Ви почнете PlenVu Prep (дата): _____

Ви будете використовувати PlenVu Prep для підготовки до тесту. У цьому аркуші ви знайдете покрокові інструкції щодо використання PlenVu Prep.

За день до тесту ви почнете PlenVu Prep.

- Випийте щонайменше 4 великі склянки води протягом дня.
- **О 18:00 год.** ви почнете підготовку
- Використовуйте посудину для змішування, щоб змішати вміст пакета Дози 1 з 16 унціями води струшуванням або за допомогою ложки до повного розчинення. Це може зайняти 2-3 хвилини.
- Випийте **все** протягом 30 хвилин після змішування.
- Між 18:00 год. і 20:00 год. вам потрібно випити **ще 1** з 16-унційних посудин прохолодної або холодної води.

Вранці перед тестом ви будете продовжувати PlenVu Prep.

- За 5 годин до тесту ви почнете приймати 2-у дозу. Це може означати, що вам доведеться встати рано, залежно від часу вашого тесту.
- Використовуйте посудину для змішування, щоб змішати вміст пакета Дози 2 (Пакет А та Пакет В) з 16 унціями води струшуванням або за допомогою ложки до повного розчинення. Це може зайняти 2-3 хвилини.
- Випийте **все** протягом 30 хвилин після змішування.
- Протягом наступних 2 годин вам потрібно випити **ще 1** з 16-унційних посудин прохолодної або холодної води.

Якщо вас нудитиме або буде блювота, зробіть 15-30 хвилинну перерву в прийомі PlenVu або води. Потім знову спробуйте випити, поки все не пройде.

Пам'ятайте . . .

- **Не пийте нічого за 3 гдини до тесту.**
- Після закінчення Prep випорожнення мають бути прозорою жовтою або прозорою зеленою водянистою рідиною. У них не повинно бути твердих або великих частин. Якщо вони не прозорі і водянисті, вам потрібно зателефонувати у наш офіс, щоб нас повідомити.



Починайте прозорі рідини _____

Жодної твердої їжі за весь день до процедури

«Останні дані та дослідження показали, що пацієнти, які приймають симетикон (GAS-X) разом із препаратом товстої кишки, мають кращі результати колоноскопії та повнішу підготовку товстої кишки. Симетикон допоможе зменшити кількість бульбашок у шлунково-кишковому тракті, що покращує візуалізацію. Ми просимо вас купити таблетки симетикону в аптеці та приймати дві (2) таблетки з кожною порцією розділеного препарату. Вони недорогі, продаються без рецепта та не потребують рецепта. Відповідно до закону ми не можемо включити їх у ваш підготовчий набір

Ваша підготовка Colyte/Golytely/NuLyte/Gavilyte/TriLyte

Ваш тест (дата): _____

Ви почнете Прер (дата): _____

Ви будете використовувати _____ для підготовки до тесту. У цьому аркуші ви знайдете покрокові інструкції щодо використання препарату.

За день до тесту ви почнете підготовку.

- Випийте принаймні 4 великі склянки води протягом дня.
- Десь у другій половині дня ви можете змішати галон готового розчину, щоб він був холодним до того часу, коли вам буде потрібно почати його пити.
 - Додайте води до верхньої лінії пляшки.
 - Якщо в Colyte присмак, який ви вибрали, помістіть його в пляшку.
 - Накрийте пляшку кришкою або ковпачком, струсіть і поставте в холодильник.
- О 18:00 год. ви почнете Прер.
- Прийміть з водою 2 таблетки Bisacodyl або Dulcolax.
- О 18:00 год. починайте пити суміш, яку ви приготували раніше.
- Випивайте склянку кожні 15-20 хвилин, доки не закінчите пів галона.

У день тесту ви будете продовжувати Прер.

- Рівно за 5 годин до тесту ви почнете пити решту суміші. Це може означати, що вам доведеться встати рано, залежно від часу вашого тесту.
- Випийте всю решту розчину. **Щоб випити це, вам знадобиться не більше години.**

Якщо вас нудитиме або буде блювота, зробіть 15-30 хвилинну перерву в прийомі Прер. Потім знову спробуйте випити, поки все не пройде.

Пам'ятайте . . .

- **Не пийте нічого за три години до процедури.**
- Після закінчення підготовки випорожнення мають бути прозорою жовтою або прозорою зеленою водянистою рідиною. У них не повинно бути твердих або великих частин. Якщо вони не прозорі і водянисті, вам потрібно зателефонувати у наш офіс, щоб нас повідомити.