



Comience con Líquidos Claros

No Alimentos Sólidos Todo el Día Antes de su Procedimiento

Datos e investigaciones recientes han demostrado que los pacientes que toman simeticona (GAS-X) con su preparación de colon tienen mejores resultados en la colonoscopia y preparaciones de colon más completas. La simeticona ayudará a reducir las burbujas en el tracto gastrointestinal, lo que mejora la visualización. Le pedimos que obtenga las tabletas de simeticona en su farmacia y que tome dos (2) tabletas con cada porción de la preparación dividida. Estas son baratas y de venta libre y no requieren receta médica. Por ley, no podemos incluirlas en su kit de preparación.

Su preparación *Colyte/Golytely/NuLyte/Gavilyte/TriLyte*

Su prueba es en: _____

Comenzará su preparación en: _____

Utilizará _____ para prepararse para su prueba. Esta hoja le dará instrucciones paso a paso sobre cómo usar la preparación.

El día antes de su prueba comenzará la preparación.

- Beba al menos 4 grandes vasos de agua durante el día.
- En algún momento de la tarde, puede mezclar un galón de la solución de preparación para que esté fría para cuando necesite empezar a beberla.
 - Añada agua a la línea superior de la botella.
 - Si el *Colyte* vino con el sabor que usted eligió, póngalo en la botella.
 - Ponga la tapa o el tapón de la botella, agítela y póngala en el refrigerador.
- A las **6:00 p.m.** comenzará la preparación.
- Tome 2 tabletas de *Bisacodyl* o *Dulcolax* con agua.
- A las **6:00 p.m.** comience a beber la mezcla que hizo antes.
- Beba un vaso cada 15 o 20 minutos hasta que haya terminado medio galón.

El día de su prueba continuará con la preparación.

- **Exactamente 5 horas antes de su prueba**, comenzará a beber el resto de la mezcla. Esto puede significar que tiene que levantarse temprano, dependiendo de la hora de su prueba.
- Beba todo el resto de la solución. **No debería tardar más de una hora en beberla.**

Si tienes náuseas o vómitos toma un descanso de 5 a 15 minutos de beber el preparación. Luego intente beber de nuevo hasta que todo haya desaparecido.

Recuerde . . .

- **No beba nada 3 horas antes de su procedimiento.**
- Después de que haya terminado su preparación, sus evacuaciones intestinales deben ser de un líquido acuoso de color amarillo claro o verde claro. No debe haber partes sólidas o grandes en él. Si no es claro y acuoso, debe llamar a nuestra oficina para informarnos.



Atrium Health

Comience con Líquidos Claros

No Alimentos Sólidos Todo el Día Antes de su Procedimiento

Datos e investigaciones recientes han demostrado que los pacientes que toman simeticona (GAS-X) con su preparación de colon tienen mejores resultados en la colonoscopia y preparaciones de colon más completas. La simeticona ayudará a reducir las burbujas en el tracto gastrointestinal, lo que mejora la visualización. Le pedimos que obtenga las tabletas de simeticona en su farmacia y que tome dos (2) tabletas con cada porción de la preparación dividida. Estas son baratas y de venta libre y no requieren receta médica. Por ley, no podemos incluirlas en su kit de preparación.

Su preparación SuPrep

Su prueba es en: _____

Comenzará su preparación SuPrep en: _____

Utilizará SuPrep para prepararse para su prueba. Esta hoja le dará instrucciones paso a paso sobre cómo usar SuPrep.

El día antes de su prueba comenzará la solución SuPrep.

- Beba al menos 4 grandes vasos de agua durante el día.
- A las **6:00 p.m.** comenzará la SuPrep.
- Vierta una botella (6 oz.) de SuPrep en el recipiente de mezcla.
- Añade agua fría para llenar la línea de 16 onzas del recipiente y revuelva.
- Bébalo **todo**.
- Entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., necesita beber **2 más** del recipiente de 16 onzas de agua fría o fresca, dentro de esta hora.

El día de su prueba continuará con la SuPrep.

- **5 horas antes** de su prueba comenzará la segunda dosis. Esto puede significar que tiene que levantarse temprano, dependiendo de la hora de la prueba.
- Vierta 1 botella (6 onzas) de SuPrep en el recipiente de mezcla.
- Agregue agua fría para llenar la línea de 16 onzas del recipiente y revuélvalo.
- Bébalo **todo**. No debería llevarle más de una hora beberlo.
- Durante las próximas 2 horas, necesita beber **2 más** del recipiente de 16 onzas de agua fría.

Si tiene náuseas o vomita, tome un descanso de 15 a 30 minutos de beber el SuPrep o el agua. Luego intente beber de nuevo hasta que todo haya desaparecido.

Recuerde . . .

- **No beba nada 3 horas antes de la prueba.**
- Después de terminar la preparación, sus evacuaciones intestinales deben ser de un líquido acuoso amarillo claro o verde claro. No debe haber partes sólidas o grandes en él. Si no es claro y acuoso, debe llamar a nuestra oficina para hacernos saber.